

Nazwa:

Starazolin Suche i Podrażnione Oczy

Postać:

krople do oczu

Opis produktu / przeznaczenie:

Krople do oczu Starazolin Suche i Podrażnione Oczy są przeznaczone do stosowania w celu zmniejszenia nasilenia objawów w łagodnej do umiarkowanej postaci zespołu suchego oka i/lub podrażnieniu powierzchni oka. Starazolin Suche i Podrażnione Oczy stabilizuje film łzowy, nawilża oko i odbudowuje jego powierzchnię.

Starazolin Suche i Podrażnione Oczy łagodzi dolegliwości również w przypadku:

- mechanicznych podrażnień (np. pieczenie, swędzenie, łzawienie) spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, np. wiatr, słońce, chlorowana woda, farmakoterapia,
- mechanicznych podrażnień powierzchni oka (np. pieczenie, swędzenie, łzawienie), spowodowanych np. noszeniem soczewek kontaktowych, interwencjami diagnostycznymi lub chirurgicznymi na oku,
- zmęczenia oczu, spowodowanego np. długotrwałą pracą przy komputerze.

Zastosowanie kropli zapewnia szybką ulgę w powyższych objawach.

Starazolin Suche i Podrażnione Oczy działa podwójnie: zawiera hialuronian sodu, który nawilża i stabilizuje film łzowy oraz dekspantenol, który łagodzi, chroni i ułatwia regenerację powierzchni oka. Łagodzenie objawów zespołu suchego oka może zapobiec powikłaniom. Najczęstsze objawy zespołu suchego oka: odczuwanie suchości, uczucie piasku pod powiekami i podrażnienia.

Starazolin Suche i Podrażnione Oczy skutecznie likwiduje objawy zespołu suchego oka, wywołane przez:

- zaburzenia filmu łzowego spowodowane brakiem łez lub ich nadmiernym odparowaniem, co może prowadzić do uszkodzenia powierzchni oka i dyskomfortu,
- środowisko (centralne ogrzewanie, klimatyzacja, światło neonowe, dym i wiatr),
- długotrwałą pracą na komputerze,
- noszenie soczewek kontaktowych,
- stosowanie kropli do oczu zmniejszających przekrwienie,
- proces starzenia (75% populacji powyżej 65. roku życia cierpi z powodu zespołu suchego oka),
- płęć (zmiany hormonalne u kobiet w okresie ciąży, karmienia piersią, menstruacji lub menopauzy),
- leki (stosowane w leczeniu depresji, nadciśnienia tętniczego, środki antykoncepcyjne),
- interwencję chirurgiczną, urazy oka lub obecność ciała obcego w oku,
- chorobę (reumatoidalne zapalenie stawów, cukrzyca, astma, problemy z tarczycą, jaskra).

Starazolin Suche i Podrażnione Oczy można stosować na soczewki kontaktowe.

Przekazy marketingowe:

Na różne objawy oczu spowodowane zespołem suchego oka lub podrażnieniem.

Starazolin Suche i Podrażnione Oczy nie zawiera konserwantów i może być stosowany aż 6 miesięcy po pierwszym otwarciu.

Skład:

chlerek sodu, diwodorofosforan sodu dwuwodny, wodorofosforan sodu bezwodny, hialuronian sodu 0,15%, dekspantenol 2%, woda oczyszczona

Stosowanie:**INSTRUKCJA UŻYCIA**

W razie potrzeby krople można stosować kilka razy na dobę.

Zakropić 1–2 krople do oczu, kilkakrotnie mrugnąć, aby roztwór uległ równomiernemu rozprowadzeniu na powierzchni oka. Produkt nie zawiera konserwantów i dlatego jest bezpieczny po podaniu do oka.

Dodatkowe informacje:**Kiedy nie stosować Starazolin Suche i Podrażnione Oczy:**

- w przypadku nadwrażliwości (uczulenia) na hialuronian sodu, dekspantenol lub jakiegokolwiek inny składnik produktu.

W razie wystąpienia reakcji alergicznej należy natychmiast przerwać stosowanie produktu i skontaktować się z lekarzem.

Inne uwagi:

- Nie stosować produktu w razie zauważenia, że buteleczka lub aplikator produktu Starazolin Suche i Podrażnione Oczy są uszkodzone.
- Aby zapewnić bezpieczne stosowanie i higienę, każda butelka powinna być używana tylko przez jedną osobę.
- Nie są znane interakcje produktu Starazolin Suche i Podrażnione Oczy z płynami do soczewek kontaktowych, innymi kroplami do oczu lub miejscowymi maściami do oczu. W przypadku zastosowania innego produktu do oczu należy odczekać 15 minut pomiędzy aplikacjami.

Uwaga:

Bezpośrednio po podaniu kropli może dojść do osłabienia ostrości widzenia. W związku z tym zaleca się, aby w tym krótkim okresie powstrzymać się od prowadzenia pojazdów lub obsługiwanie maszyn i poczekać do odzyskania ostrości widzenia.

Warunki przechowywania:

Przechowywać produkt w temperaturze do 25°C w oryginalnym opakowaniu. Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Dostępne wielkości opakowań:

10 ml

Producent:

JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ d.d.,
Svilno 20, 51000 Rijeka,
Chorwacja

Dystrybutor/importer/upoważniony przedstawiciel:**DYSTRYBUTOR**

Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.
83-200 Starogard Gdański
ul. Pelplińska 19